

Pokyny k aplikaci:

AKRA N-Bakterien

AKRA


Karner Düngerproduktion

Azotobacter + Azoarcus

Stav 2014/15

Pěstování řepky

Vývojová stádia



00-09	10	11	20-29	30-39	50	57	60	70	80-89	
Klíčení	Děložní lístky	První pravý list	Přízemní růžice	Dlouhivý růst	Hlavní květenství viditelné	Jednotlivé květy viditelné	Plné kvetení	Tvoření šešulí	Dozrávání	Srniště

od EC 20 do 57


- AKRA Azotobacter 0,5 litru
- + AKRA Plus 9 0,5 litru
- + AKRA Blatt 2 litry
- + 10 kg Močovina
- + 1 litr AKRA MSB

2. Postřik možný – nejpozději EC 50

max. dávka dusíku 150 N/ha

Pěstování cukrové řepy

Vývojová stádia



	00	07	09	10	12	14	15-16	39	49	
Mezplodina	Těsně po zasetí	Klíčení	Krátce před vzejitím	Děložní lístky	První pravé listy 2.listy	2.pár pravých listů	4-6 pravých listů	Krátce před zapojením řádků		Po sklizni


od EC 16 do 39

- AKRA Azotobacter 0,5 litru
- + AKRA Plus 9 0,5 litru
- + AKRA Blatt 2 litry
- + 10 kg Močovina
- + 1 litr AKRA MSB

2. Postřik možný při redukcí dávky dusíku
max. dávka dusíku 60 N/ha

Pěstování brambor

Vývojová stádia



	03	09	21	29	39	51	60	70	91	99	
Po zasetí	Klíčení	Vzcházení	Tvorba listů a lodyhy	Prodlužovací růst	Uzavřený porost	Tvorba poupát	Kvetení	Tvorba bobulí	Žloutnutí rostliny	Zralost hlíz Sklizeň	Po sklizni

od EC 25 do 50


- AKRA Azotobacter 0,5 litru
- + AKRA Plus 9 0,5 litru
- + AKRA Blatt 2 litry
- + 10 kg Močovina
- + 1 litr AKRA MSB

2. Postřik možný nejpozději EC 50

max. dávka dusíku 60 N/ha

Pěstování kukuřice

Vývojová stádia



	00	10	11	12	13	14	16	18-29	32	53	59	65	75	80	
Mezi-plodina	Těsně po zasetí	Vzcházení	1-list	2-list. stadium	3-list stadium	4-list stadium	6-list stad.	8.-11. pravých listů	Viditelná palice	Vrcholová lata viditelná	Vrchol. lata rozvinutá	Plný květ	Mléčná zralost	Zralost	Strništé

od EC 14 do 30

- AKRA Azotobacter 0,5 litru
- + AKRA Plus 9 1 litr
- + AKRA Blatt 4 litry
- + 10 kg Močovina
- + 1 Litr AKRA MSB

max. dávka dusíku 110 N/ha

Všeobecné INFO při aplikaci AKRA N – bakterií!

Použití bakterií: nestříkat při přímém slunečním svitu!

Při aplikaci herbicidů: 4 dny předtím až 4 dny po aplikaci herbicidů neaplikovat AKRA N - bakterie!!